



En Sudamérica se registra una “transmisión sostenida” de la fiebre amarilla, según la Organización Panamericana de la Salud

Posted on Marzo 14, 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó mediante un boletín que se emitió una alerta epidemiológica en la que advierte sobre la “transmisión sostenida” de fiebre amarilla en partes de la región, con casos que continúan registrándose en 2026 y con detección en áreas más allá de los focos tradicionales de la cuenca amazónica.

“Desde septiembre de 2024 se han notificado casos de fiebre amarilla en áreas donde no se habían registrado previamente en la región, incluidos algunos fuera de la Amazonía”, se lee en el comunicado. En ese sentido, la organización llamó a los Estados miembros a que fortalezcan la vigilancia epidemiológica, así como a intensificar las campañas de vacunación en poblaciones en riesgo.

De acuerdo con la OPS, en 2025 se notificaron 346 casos confirmados de fiebre amarilla con 143 fallecimientos en siete países de la región: Bolivia (ocho casos, dos defunciones), Brasil (120 casos, 48 defunciones), Colombia (125 casos, 46 defunciones), Ecuador (11 casos, ocho defunciones), Guyana, Perú

(49 casos, 19 defunciones) y Venezuela (32 casos, 19 defunciones).

“La detección de casos en zonas cercanas a centros urbanos aumenta el riesgo de transmisión urbana de la fiebre amarilla, en la que el virus se transmite entre personas a través del mosquito *Aedes aegypti*, lo que puede provocar brotes de rápida propagación”, se añade en el comunicado.

El Maipo/Sputnik