



Heces y orina de roedores en el foco del hantavirus en un crucero, ahora bajo vigilancia sanitaria

Posted on Mayo 7, 2026

Por Arantxa G.

Heces y orina de roedores en el foco del hantavirus en un crucero después de que varias muertes y casos graves registrados en el buque MV Hondius despertaran preocupación internacional sobre esta enfermedad poco frecuente.

El barco, que había partido desde Ushuaia, en Argentina, y realizado rutas por zonas cercanas a la Antártida antes de dirigirse hacia Cabo Verde, **quedó bajo vigilancia sanitaria** tras detectarse posibles contagios compatibles con hantavirus entre pasajeros y tripulación.

El episodio **volvió a colocar bajo atención pública una infección** que normalmente se relaciona con la exposición a restos contaminados de ratones y ratas infectadas.

Heces y orina de roedores en el foco del hantavirus en un crucero mientras epidemiólogos y organismos internacionales insistían en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo y que la transmisión entre humanos sigue siendo extremadamente rara.

Heces y orina de roedores en el foco del hantavirus en un crucero

El posible brote detectado en un barco turístico internacional volvió a situar bajo atención sanitaria un virus asociado principalmente al contacto con restos contaminados de roedores infectados.

Respirar el aire viciado en lugares cerrados donde habitan los roedores constituye el mayor peligro para la **salud. El patógeno se aloja en las partículas invisibles que los humanos absorben**, especialmente al limpiar las zonas más descuidadas.

Detectar el origen del brote resulta bastante complejo porque los síntomas pueden tardar semanas en manifestarse. Este retraso impide confirmar si el contagio ocurrió durante la navegación o en una estancia previa en tierra.

El hantavirus puede provocar cuadros respiratorios extremadamente graves

El hantavirus **pertenece a una familia de virus transmitidos principalmente por roedores** y detectados inicialmente en Corea del Sur durante la década de 1970. Su nombre procede del río Hantan, donde fue identificado por primera vez.

Los especialistas explicaron que **existen distintas variantes según la región geográfica**. Las cepas europeas suelen producir cuadros más leves, mientras que las variantes americanas pueden desencadenar graves complicaciones pulmonares y renales.

Las formas más agresivas del hantavirus pueden derivar en insuficiencia respiratoria severa, neumonías bilaterales y fallo renal potencialmente mortal. No todos los pacientes desarrollan síntomas críticos, pero algunos casos requieren ingreso inmediato en unidades de cuidados intensivos.

Los epidemiólogos señalaron además que **la gravedad depende tanto del subtipo viral como de la rapidez con la que el paciente reciba atención médica** especializada.

La aparición simultánea de varios casos graves dentro de un crucero internacional convirtió el episodio en una situación sanitaria excepcional y muy poco habitual. Las autoridades sanitarias investigaron varios contagios sospechosos relacionados con el barco.

Los expertos recordaron además que el hantavirus continúa siendo una enfermedad rara en Europa y especialmente infrecuente en España.

La inhalación de partículas contaminadas es la principal vía de contagio

Los especialistas coincidieron en que **el principal mecanismo de transmisión continúa siendo la exposición a heces, orina o saliva de roedores infectados.**

El virus puede permanecer en partículas microscópicas suspendidas en el aire y entrar en el organismo mediante inhalación, especialmente en espacios cerrados o contaminados donde han estado presentes ratones o ratas.

La limpieza de zonas contaminadas sin protección adecuada puede aumentar considerablemente el riesgo de infección. También pueden actuar como fuente de contagio alimentos, superficies o envases expuestos a restos biológicos contaminados.

Los expertos explicaron que **el período de incubación puede extenderse durante semanas,** dificultando determinar el lugar exacto donde se produjo el contagio.

Entre la exposición al virus y la aparición de síntomas pueden transcurrir más de dos semanas e incluso hasta dos meses. Esta circunstancia complica saber si los afectados contrajeron la infección dentro del barco o antes del embarque.

Las autoridades sanitarias insistieron en que **el control de roedores y las medidas de higiene siguen siendo fundamentales** para prevenir este tipo de infecciones.

Los especialistas también recordaron que **la presencia ocasional de roedores en embarcaciones comerciales o turísticas no representa una situación completamente extraordinaria** dentro del tráfico marítimo internacional.

La transmisión entre personas continúa siendo

muy poco frecuente

Uno de los principales focos de preocupación tras conocerse el brote **fue la posibilidad de contagio entre pasajeros y tripulantes** dentro del crucero. Sin embargo, los epidemiólogos insistieron en que el hantavirus no presenta un comportamiento similar al de virus altamente contagiosos entre humanos.

La gran mayoría de variantes del hantavirus apenas muestran capacidad de transmisión de persona a persona. La enfermedad se considera principalmente una zoonosis, es decir, una infección transmitida desde animales hacia humanos.

Los expertos explicaron que únicamente algunas variantes concretas, como el virus de los Andes detectado en Sudamérica, han mostrado casos aislados de transmisión humana bajo circunstancias muy específicas.

La Organización Mundial de la Salud pidió evitar alarmismos y recalcó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. El organismo internacional descartó además la necesidad de imponer restricciones generales de viaje. Los especialistas creen que los casos detectados en el crucero probablemente estuvieron relacionados con una exposición común a la misma fuente contaminada.

Precisamente esa limitada capacidad de transmisión explica por qué el hantavirus no representa actualmente una amenaza pandémica global.

Sudamérica concentra algunas de las variantes más peligrosas del virus

Aunque el hantavirus existe en distintas regiones del planeta, **Sudamérica aparece entre las zonas donde se han documentado algunas de las variantes más agresivas** y con mayor mortalidad. Argentina, país desde donde partió el crucero afectado, figura entre los territorios donde el virus se diagnostica con relativa frecuencia.

Las cepas americanas del hantavirus suelen provocar cuadros respiratorios mucho más graves que las variantes detectadas habitualmente en Europa. Esta situación incrementó la preocupación inicial tras conocerse los fallecimientos registrados a bordo.

Los expertos explicaron que **la distribución del virus depende directamente de las especies de**

roedores presentes en cada región y de determinadas condiciones ambientales.

Las zonas rurales y espacios cerrados con presencia prolongada de ratones representan los principales entornos de riesgo para esta enfermedad. Actividades agrícolas, almacenes o áreas poco ventiladas pueden favorecer exposición al virus.

En España y gran parte de Europa, los casos siguen siendo excepcionales y generalmente asociados a variantes menos agresivas. La vigilancia epidemiológica internacional permitió además activar rápidamente protocolos sanitarios y medidas de seguimiento sobre el crucero afectado.

El tratamiento depende principalmente de cuidados intensivos

Actualmente **no existe un tratamiento antiviral específico capaz de eliminar directamente el hantavirus**, por lo que la atención médica se centra en estabilizar al paciente hasta que el organismo consiga controlar la infección. En los casos más graves resulta fundamental el acceso rápido a unidades hospitalarias preparadas para proporcionar soporte respiratorio intensivo.

La rapidez en la atención médica puede marcar la diferencia en pacientes con insuficiencia pulmonar severa causada por hantavirus. Precisamente uno de los principales problemas dentro del crucero fue la dificultad para ofrecer cuidados intensivos avanzados en alta mar.

El tratamiento suele incluir ventilación asistida, control cardiovascular y seguimiento constante de posibles complicaciones renales. **La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente al hantavirus debido a la ausencia de una cura específica.**

Las medidas de higiene, ventilación adecuada y control de roedores continúan siendo fundamentales tanto en barcos como en instalaciones portuarias y espacios cerrados. Los expertos insistieron además en que **la aparición de varios casos en un mismo entorno no implica automáticamente riesgo elevado** para el resto de pasajeros o para la población general.

Las investigaciones sanitarias continúan intentando determinar cómo se produjo exactamente la exposición inicial dentro del entorno del crucero.

A diferencia de otras infecciones, **el virus apenas se propaga entre las personas**, considerándose una enfermedad de origen animal. Por ello, los expertos descartan una crisis global y piden evitar el pánico innecesario.

Sin medicinas específicas, **la supervivencia depende exclusivamente de la rapidez del soporte hospitalario avanzado**. La higiene rigurosa y el control de plagas siguen siendo las únicas barreras efectivas contra esta amenaza. El Ministerio de Sanidad elaboró un informe de la situación del crucero hasta ahora

Conclusiones sobre las heces y orina de roedores en el foco del hantavirus en un crucero

El posible brote registrado en el MV Hondius volvió a poner bajo atención internacional una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave en determinadas circunstancias. Los especialistas insistieron en que el hantavirus sigue siendo una infección rara y con muy limitada capacidad de transmisión entre personas.

La investigación epidemiológica permitirá aclarar si existió una fuente concreta de contaminación vinculada a restos **biológicos** de roedores dentro o fuera de la embarcación. **Los organismos internacionales mantienen el mensaje de calma y recuerdan que las principales herramientas de prevención continúan siendo la higiene, el control de roedores y la detección médica temprana.**

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados mediante contacto con heces, orina o saliva contaminada. Algunas variantes pueden provocar graves complicaciones respiratorias y renales.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El contagio suele producirse por **inhalación de partículas contaminadas procedentes de heces y orina de ratones o ratas infectadas**, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

¿El hantavirus se transmite fácilmente entre personas?

No. **La transmisión entre humanos es extremadamente rara y solo se ha documentado en situaciones muy concretas asociadas a determinadas variantes del virus.**

¿Existe tratamiento específico contra el hantavirus?

Actualmente no existe una cura antiviral específica. **El tratamiento se basa principalmente en cuidados intensivos y soporte respiratorio hasta que el organismo consiga controlar la infección.**

El Maipo/Ecoticias