



La gripe aviar regresa antes de lo previsto a Minnesota, pillando desprevenida a la industria avícola.

Posted on Septiembre 30, 2026

(Minnesota - EEUU) La influenza aviar altamente patógena (IAAP) ha reaparecido en Minnesota mucho antes de lo habitual, y las autoridades sanitarias estatales han confirmado brotes en diez granjas avícolas desde el 1 de septiembre, incluyendo siete explotaciones comerciales y tres granjas familiares, afectando a más de 260 000 aves en total. Esta coincidencia temporal ha inquietado a las autoridades de un estado que produce más pavos que ningún otro en el país.

Minnesota llevaba aproximadamente un mes y medio sin casos confirmados de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) tras una oleada de infecciones detectada en la primavera de 2026. El virus reapareció el 1 de septiembre en una granja comercial de casi 29.800 aves en el condado de Wright, al oeste del área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, y desde entonces se ha detectado en otras granjas comerciales y particulares en todo el estado. Shauna Voss, subdirectora de la Junta de Salud Animal de Minnesota, afirmó que la aparición temprana tomó por sorpresa a las autoridades. «Normalmente, la enfermedad aparece en octubre», dijo Voss. «Se desconoce por qué la IAAP está aquí tan pronto este otoño».

Minnesota cría aproximadamente 45 millones de pavos al año, más que cualquier otro estado de EE. UU.,

lo que lo convierte en un indicador clave de cómo le irá al sector avícola del país durante la temporada migratoria de otoño, cuando las aves acuáticas silvestres suelen transmitir el virus a las granjas comerciales. Los productores del estado han invertido considerablemente en los últimos años en medidas de bioseguridad, como puntos de entrada controlados, equipos especializados y protocolos más estrictos para los visitantes; sin embargo, el virus ha demostrado ser persistente, especialmente en las explotaciones al aire libre y de cría extensiva, que tienen más puntos de contacto con las poblaciones de aves silvestres.

El inicio temprano de la enfermedad plantea interrogantes para la próxima temporada.

La precocidad de la detección es crucial, ya que reduce el tiempo que los productores suelen tener para preparar las medidas de protección antes del pico de la migración de aves silvestres. Las autoridades estatales no han determinado la razón del regreso del virus un mes antes de lo habitual, aunque los investigadores de la influenza aviar han señalado previamente que los cambios en el calendario migratorio y la expansión de los reservorios virales en las poblaciones de aves silvestres podrían ser factores contribuyentes en varias temporadas de gripe. La Junta de Salud Animal de Minnesota no ha anunciado nuevas medidas obligatorias más allá de sus protocolos de vigilancia y notificación existentes, pero es probable que las detecciones tempranas impulsen una mayor atención al cumplimiento de las normas de bioseguridad en toda la zona avícola del estado, de cara a los meses de mayor riesgo de octubre y noviembre.

Las repetidas oleadas de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en Norteamérica durante los últimos años han reducido periódicamente el suministro de pavo y huevos, y han elevado los precios minoristas cuando se ha tenido que sacrificar un gran número de aves para contener los brotes. Que este brote inicial se convierta en una temporada comparable a años anteriores de gran gravedad dependerá en gran medida de la rapidez con que se propague el virus una vez que se intensifique el tráfico de aves migratorias en las próximas semanas.