



La ONU alerta: el océano pierde capacidad para absorber CO₂ y deja más carbono en la atmósfera

Posted on Octubre 30, 2026

Por Jordi Company

El océano pierde capacidad para absorber CO₂ por crisis climática y los cambios en sus aguas y ecosistemas. Un informe de la ONU cifra esa reducción en cerca del 6 % y reclama proteger los sumideros marinos.

El océano pierde capacidad para absorber CO₂

El **océano pierde capacidad para absorber CO₂** y eso tiene una consecuencia nefasta: **más dióxido de carbono permanece en la atmósfera y alimenta el calentamiento global**. Un nuevo estudio de Naciones Unidas, publicado antes de la **COP31**, estima que su capacidad de absorción ya ha disminuido **cerca de un 6 %** por el cambio climático.

El aviso afecta a uno de los grandes reguladores del clima. El océano absorbe el **30 % de las emisiones humanas de CO₂** y el **90 % del exceso de calor** atrapado por los gases de efecto invernadero. Sin

embargo, el incremento de la temperatura y las alteraciones de la química, las corrientes y los ecosistemas marinos debilitan ese servicio.

El informe plantea reforzar la observación y recuperar manglares, marismas y praderas marinas para preservar su función como almacenes de carbono. También advierte de que las tecnologías destinadas a retirar CO₂ del mar siguen rodeadas de incertidumbres: **deben complementar la reducción de emisiones, nunca sustituirla.**

El exceso de calor

El aumento de las temperaturas, junto con las alteraciones de la química, la circulación y los ecosistemas marinos, trae como consecuencia que el océano pierde capacidad para absorber CO₂ y almacenarlo. El resultado: una mayor parte del CO₂ permanece en la atmósfera, lo que alimenta aún más el calentamiento global.

El océano absorbe alrededor del 30% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de origen humano y el 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Pero el calentamiento global está debilitando ese papel esencial: su capacidad de absorber carbono ya ha disminuido cerca de un 6%, según un nuevo informe de la ONU publicado en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP31.

Fruto de una colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que coorganiza la COP31 en noviembre, el informe pone de relieve los riesgos asociados al debilitamiento de este regulador natural del clima.

«Durante mucho tiempo, el océano nos ha prestado un servicio inmenso en materia de clima, pero ese servicio está sometido a una presión creciente», declaró a Noticias ONU Sara Traerup, autora principal del informe.

El aumento de las temperaturas, junto con las alteraciones de la química, la circulación y los ecosistemas marinos, reduce la capacidad del océano para absorber y almacenar carbono. **El resultado: una mayor parte del CO₂ permanece en la atmósfera**, lo que alimenta aún más el calentamiento.

Y esa tendencia «**puede muy probablemente acelerarse**» en un futuro próximo, advirtió Traerup.

Conocer mejor el océano para evitar catástrofes

Para los autores del informe el hecho de que el océano pierde capacidad para absorber CO₂, es uno de los principales obstáculos a una mejor gestión del carbono oceánico sigue siendo la falta de datos fiables. Las lagunas son especialmente importantes en el océano Austral, el océano Índico y el Ártico, así como en numerosas zonas costeras.

El informe recomienda por ello reforzar los conocimientos sobre el carbono oceánico movilizándolo la ciencia, las tecnologías, los datos y los saberes locales, a fin de comprender mejor el funcionamiento de estos sistemas y preservar su capacidad de almacenar carbono.

«En la actualidad no disponemos de información completa sobre el océano, y lo que no conocemos no podemos gestionarlo ni protegerlo», subrayó Traerup.

De los sensores a las praderas marinas

El PNUMA examina tres grandes categorías de tecnologías relacionadas con el clima oceánico, que presentan perspectivas y riesgos distintos ante la evidencia de que el océano pierde capacidad para absorber CO₂.

La primera se refiere a los instrumentos de vigilancia: sistemas de observación, sensores, infraestructuras de datos y modelos que permiten seguir la evolución del océano y del carbono que absorbe. Estas tecnologías son las más avanzadas y figuran entre las necesidades más urgentes, según Traerup.

La segunda abarca los ecosistemas denominados de **«carbono azul»**, en particular los manglares, las praderas marinas y las marismas. Estos medios captan ya unos 407 millones de toneladas de CO₂ al año. **Su restauración podría aumentar ese almacenamiento**, al tiempo que protege los litorales, favorece la biodiversidad y sostiene los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.

Por último, los métodos de eliminación del dióxido de carbono en medio marino buscan extraer el CO₂ de la atmósfera y almacenarlo de forma duradera. Aunque ofrecen perspectivas, siguen rodeados de incertidumbres y **requieren más investigación, seguimiento y regulación**.

«No debemos considerar las tecnologías oceánicas como un atajo», advirtió Traerup. Estas soluciones deben complementar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de los ecosistemas, y no sustituirlas.

Estados insulares bajo presión

Los pequeños Estados insulares en desarrollo son responsables de menos del 1% de las emisiones mundiales, pero **figuran «en primera línea frente a los impactos sobre los océanos y el clima»**, subrayó Traerup.

El informe pide facilitarles el acceso a financiación, transferencia de tecnologías y fortalecimiento de capacidades, para que puedan desarrollar soluciones adaptadas a sus realidades y prioridades.

Seychelles ofrece un ejemplo de mecanismo de financiación innovador. En 2015, el archipiélago alcanzó un acuerdo de conversión de deuda en favor de la conservación de la naturaleza, **reestructurando parte de su deuda externa a cambio de compromisos de protección marina**. Esta operación permitió crear un fondo fiduciario dedicado a la conservación de los océanos, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible de la economía azul.

En el Pacífico, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu han recibido, por su parte, **apoyo para cartografiar sus praderas marinas y manglares y medir las cantidades de carbono que almacenan**. Más de 100 personas han sido formadas así en la evaluación del carbono azul, proporcionando a los gobiernos datos útiles para la elaboración de sus planes nacionales sobre el clima.

El informe insiste también en la necesidad de tener en cuenta los conocimientos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

«Las comunidades hacen frente al cambio climático desde hace muchísimos años», recordó Traerup, subrayando su experiencia en la protección de las costas mediante hábitats naturales y en la gestión sostenible de la pesca y los recursos costeros.

Organización Meteorológica Mundial

La presión sobre este regulador climático se mide también bajo la superficie. Según la **OMM**, en **2025 el calor acumulado en los primeros 2.000 metros del océano alcanzó su máximo desde que comenzaron los registros en 1960**. Además, el ritmo del calentamiento entre **2005 y 2025** fue más del doble del observado entre 1960 y 2005. Estas cifras refuerzan la urgencia de reducir las emisiones: el océano sigue amortiguando el calentamiento, pero lo hace mientras acumula cantidades récord de energía que alteran los ecosistemas de los que depende parte de su capacidad para almacenar carbono.