



Los casos de gripe aviar disminuyen en la Unión Europea durante la primavera.

Posted on Junio 29, 2026

(Unión Europea) Según el último informe trimestral de seguimiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y el Laboratorio de Referencia de la UE (EURL), la detección de la gripe aviar altamente patógena (HPAI) disminuyó en Europa durante la primavera de 2026 y se prevé que se mantenga baja durante el verano. El riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Entre el 28 de febrero y el 4 de junio de 2026, los Estados miembros de la UE notificaron 186 brotes en aves de corral y aves en cautividad, así como 763 detecciones en aves silvestres. Si bien el número de brotes en aves domésticas es similar al del mismo periodo del año anterior, las detecciones en aves silvestres fueron al menos tres veces superiores este año, lo que refleja una circulación viral muy elevada en las aves acuáticas.

Los científicos también consideraron que el número de detecciones de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en mamíferos era bajo, dado el elevado número de brotes durante el período invernal. Los zorros rojos fueron la especie de mamífero más afectada en la UE.

Primeras detecciones del clado G5.5 H9N2 en aves de corral

El informe también señala que Hungría notificó casos de gripe aviar H9N2 de baja patogenicidad en siete granjas avícolas. Si bien ya se habían detectado casos de H9N2 en la UE, esta es la primera detección del clado específico H9N2 G5.5, que también ha sido responsable de casos humanos ocasionales en Oriente Medio y África Occidental. La EFSA y el ECDC recomiendan a los Estados miembros que sigan de cerca esta situación.

El Maipo/Agricultura Global