



Minsal confirma caso importado de sarampión y refuerza llamado a vacunación

Posted on Enero 18, 2026

El Ministerio de Salud informó que un adulto proveniente de Europa fue diagnosticado con sarampión en la Región Metropolitana. Las autoridades descartan transmisión local y mantienen vigilancia activa de contactos.

El Instituto de Salud Pública confirmó el 9 de enero de 2026 un caso importado de sarampión en Chile, correspondiente a una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, quien hizo escala en Uruguay. El paciente, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país, se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

Hasta la fecha, no se ha identificado transmisión secundaria en el territorio nacional. Los equipos de salud han alertado a 380 contactos identificados, de los cuales 208 se encuentran en Chile, manteniéndose las acciones de seguimiento según la normativa nacional.

Contexto regional preocupante

La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin, explicó que desde el

año pasado Chile mantiene vigilancia epidemiológica tras detectarse un brote en América del Norte. En México, Canadá y Estados Unidos se registraron 14 mil casos y 29 muertes, donde el 89% de los afectados no había sido vacunado y el 93% de los hospitalizados estaba en la misma condición.

“Chile ha sido calificado como país libre de sarampión por la OPS. El llamado especial es para padres, madres y cuidadores de niños de 1 a 3 años: mantengan al día la vacuna de sus hijos, disponible gratuitamente en vacunatorios. Es segura y altamente efectiva”, señaló Aylwin.

Alta contagiosidad y síntomas a vigilar

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas respiratorias. Por cada persona infectada, se contagian en promedio otras 18 personas. El período de contagio abarca desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.

Las autoridades llaman a estar atentos a los siguientes síntomas: fiebre alta mayor de 38°, tos, congestión nasal, conjuntivitis, manchas blancas en mucosa bucal, intolerancia a la luz, y exantema macular (manchas rojizas planas que se extienden por el cuerpo partiendo por la cabeza). En casos graves, puede derivar en neumonía, ceguera y diarrea intensa.

Recomendaciones para la población

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, hizo un llamado a la calma y a revisar el esquema de vacunación. En Chile se vacuna a los niños al año y a los tres años, con una inmunidad superior al 90%.


Para quienes planean viajar al extranjero, se recomienda revisar su esquema de vacunación. En el caso de menores de un año, se sugiere adelantar el procedimiento. Los adultos nacidos entre 1971 y 1981 deben considerar vacunarse, dado que no existe certeza de que hayan recibido las dos dosis necesarias.

Si presenta síntomas, use mascarilla inmediatamente, acuda a un centro de salud, evite el contacto con otras personas e informe sobre sus antecedentes de viaje.

Las autoridades anunciaron que ampliarán la campaña informativa en las próximas semanas, considerando la temporada de vacaciones y los viajes al exterior.

Guía de Alerta contra el Sarampión: Identificación y Acción

TRANSMISIÓN Y SÍNTOMAS



Transmisión Altamente Contagiosa

Se transmite por gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar entre personas.

Síntomas Críticos a Observar

-  Fiebre alta
-  manchas rojas en la piel
-  conjuntivitis
-  sensibilidad a la luz

Periodo de Incubación
7 a 21 días

Ventana de Contagio
4 días antes a 4 días después del exantema

Duración de Manchas
3 a 7 días

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA

Medidas de Prevención Primaria



Mantener el esquema de vacunación al día



lavarse las manos frecuentemente

Protocolo ante Sospecha



Usar mascarilla



evitar contacto con otros



acudir pronto a un centro de salud



Higiene Respiratoria

Cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar.